



DLP 14-10-87044952

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Rue Saint-Jean • BP 19 • 31131 BALMA CEDEX
Tél. 61. 24. 06. 51

PUBLICATION PÉRIODIQUE
Abonnement annuel 125 F.
REGISSEUR DE RECETTES: D.R.A.F. "MIDI-PYRENEES"
CCP : 8618-62 Y Toulouse

I.S.S.N. : 0752-2053

BULLETIN N° 14 DU 9 OCTOBRE 1987

COLZA

Actuellement, les cultures ayant levé sont rares.
Avec l'arrivée des pluies de ce début de semaine, les levées devraient être généralisées dans le courant de la période du 12 au 17 octobre.

LIMACES

Surveiller la présence de limaces (en déposant une poignée de produit molluscide sous une tuile canal en quelques points de la parcelle).
L'observation de limaces mortes sous ces tuiles révèle l'importance de leur activité.

Utiliser des appâts empoisonnés sous forme granulée à base de :

- mercaptodiméthur (3 à 5 kg selon les spécialités)
- ou - métaldéhyde (5 à 10 kg selon les spécialités)

GROSSE ALTISE

Surveiller les parcelles n'ayant pas reçu de protection insecticide au semis.

Intervenir dans ces parcelles :

- de la levée au stade 2 feuilles vraies :
lorsque des morsures sont observées sur environ 1/3 des pieds.
- après le stade 2 feuilles :
dès que plus de **30 captures cumulées** d'adultes de grosse altise sont notées dans une cuvette jaune enterrée au niveau du sol, ses bords dépassant légèrement la surface du sol.

Utiliser l'un des produits indiqués dans la fiche jointe à notre précédent bulletin.

DESHERBAGE DE POST-LEVEE

Dans le tableau au verso figurent les produits utilisables après la levée du colza.

P.120

TABLEAU DES HERBICIDES UTILISABLES EN POST-LEVÉE DU COLZA

MATIERES ACTIVES	SPECIALITES COMMERCIALES	Dose de spécia- lité/ha	EPOQUE D'APPLICATION	OBSERVATIONS	ACTION SUR	
					GRAMINEES	DICOTYLEDONES
carbétamide + diméfurone	PRADONE TS	3,5/4 kg	Dès le stade 6 feuilles vraies du colza. Avant fin décembre.	Application possible sur sol gelé. Utiliser sur colzas sains et bien implantés.	Bonne	Bonne sur véroni- que, matricaire, stellaire, coquel- icot, lamier. Irrég- ulière sur pensée, gaillet. Insuffi- sante sur sanve.
propyzamide	KERB 50 W	1,5 kg	Dès le stade 3 feuilles vraies du colza, jusqu'à 3 semaines avant la re- prise de végétation.	Utilisable sur sol gelé. La dose peut être aug- mentée sur graminées vi- vaces (3kg sur chiendent et 2kg sur avoine à cha- pelet).	Bonne	(*)
propyzamide + diuron	KERB-ULTRA	1,2 kg	Dès le stade 4 feuilles vraies bien développées, 6e feuille naissante du colza. De préférence avant l'hiver.	Utiliser sur colzas sains, bien implantés.	Bonne	Moyenne sur sanve et ravenelle.
diméfurone + clopyralid	CLERDONE	2,5 l	Dès le stade 4 feuilles vraies du colza.	Sur colzas sains bien enracinés (pivot > 10 cm).	Bonne sur pâturin, vulpin. Insuffi- sante ou à confir- mer sur les autres	Bonne sur véroni- que, matricaire, co- quelicot, anthémis, stellaire, gaillet, alchémille, lamier. Moyenne sur panic et capselle. Nulle sur sanve.
clopyralid	LONTREL SF 100	0,75 à 1,25 l + 3 l huile SCHERING	De la levée jusqu'au stade boutons floraux du colza.	Utiliser sur mauvaises herbes développées par t° supérieures à 10°.	(*)	Bonne sur anthémis matricaire, char- don et laituron.
carbétamide	LEGURAME PM	3 kg	Dès le stade 4 feuilles vraies du colza, jusqu'à 3 semaines avant la re- prise de végétation.	Application possible sur sol gelé.	Bonne	(*)
		5 à 6 kg	De novembre à fin janv.	Contre chiendent.		
alloxydime- sodium	FERVIN	0,75/1 kg + 3 l huile SCHERING	Utilisable à tout stade du colza, de la levée au stade début montaison des graminées. (Uniquement à l'automne pour le GALLANT)	Appliquer de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec) Augmenter la dose (con- sultez firme) pour mail- leure efficacité sur graminées vivaces.	Bonne sauf sur pâturin.	(*)
séthoxydime	FERVINAL	2 l + 3 l huile SCHERING				
fluazifop- butyl	FUSILADE X 2	0,5/0,7 l + 0,1 % vol. AGRAL				
halloxyfop éthoxyéthyl	GALLANT	1 l				
quizalofop éthyl	TARGA	1,25 l + 2 l huile SIFREN				

(*) Action nulle ou insuffisante